

FICHA TÉCNICA CASTA 310 SC



Actualización: 08/02/2023



Insecticida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo: Fipronil + Lamdacihalotrina
Concentración: 250 g/L + 60 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Fenilpirazol + Piretroide

MODO DE ACCIÓN: Insecticida que actúa por Contacto e Ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: Bloquea los receptores GABA e interfiere el paso de los iones cloruro a través de los canales GABAICOS. La Lambdacihalotrina genera un desbalance electroquímico en el axón que impide el paso del impulso nervioso. Modulador de los canales de sodios

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CEBOLLA	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	200 cc / 200 L 600 cc/ha	4 horas	15 días
CEBOLLA	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	150 cc / 200 L 450 cc/ha	4 horas	15 días
CLAVEL	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 cc / L 480 cc/ha	4 horas	N.A.
FRIJOL	Minador (<i>Liriomyza spp.</i>)	200 cc / 200 L 600 cc/ha	4 horas	15 días
PAPA	Gusano blanco (<i>Pemnotrypes vorax</i>)	200 - 250 cc / 200 L 650 - 740 cc/ha	4 horas	15 días
PASTOS*	Chinche de los pastos (<i>Collaria scenica</i>)	1 cc / L 200 cc/ha	24 horas	15 días
POMPÓN	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 cc / L 480 cc/ha	4 horas	N.A.
ROSA	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 cc / L 480 cc/ha	4 horas	N.A.



FICHA TÉCNICA CASTA 310 SC

P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. El valor PR contenido en la presente etiqueta fue calculado por evaluación del riesgo (método 2. Res. ICA 00011768)

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.)

N.A.: No aplica.

* **Para ganado:** El periodo de reentrada aplica para el reingreso de animales al potrero o área de pastoreo. PR calculado por peligrosidad (método 1. Res. ICA 00011768).

Advertencia: “Para aplicaciones aéreas y terrestres, se debe respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua”
No contamine las aguas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad y compatibilidad de mezcla antes de su aplicación comercial.

PRESENTACIONES: 200 mililitros, 1 Litro

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2886012



Registro Nacional ICA No. 879
Formulado, Distribuido y Comercializado por:
QUIMICOS OMA S.A.
Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3
Parque Empresarial AEPI, Bodega 16
PBX: 8985179 – E. Mail: servicioalcliente@quimicosoma.com
Cota (Cundinamarca), Colombia
www.quimicosoma.com