

FICHA TÉCNICA ZAFIRO 425 ME

Actualización: 08/02/2023



Fungicida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Microemulsión (ME)
Ingrediente activo: Propamocarb HCl +Metalaxil
Concentración: 350 g/L + 75 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Carbamato + Acilalanina

MODO DE ACCIÓN: Fungicida sistémico; preventivo y curativo

MECANISMO DE ACCIÓN: Penetra rápidamente a los tejidos internos de la planta, transportándose ascendentemente por el xilema, proporcionando protección total y prolongada al cultivo. Afecta la integridad de la membrana y la síntesis de ácidos nucleicos en la RNA polimerasa. Reduce el crecimiento y desarrollo del fitopatógeno.

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CEBOLLA (Bulbo)	Mildeo veloso (<i>Peronospora destructor</i>)	1.2 - 1.5 L / ha	4 horas	14 días
PAPA	Gota o tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.2 L / ha	4 horas	14 días
PIÑA	Podredumbre del corazón (<i>Phytophthora parasitica</i>)	1 L / ha	4 horas	14 días
ROSA	Mildeo veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	720 c.c. / ha	4 horas	N.A.
TOMATE	Gota o tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 L / ha	4 horas	14 días
UVA	Mildeo veloso (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,6 L/ha (1,5 cc/L)	4 horas	14 días

P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. El valor PR contenido en la presente etiqueta fue calculado por evaluación del riesgo (método 2. Res. ICA 00011768).

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A.: No Aplica

FICHA TÉCNICA ZAFIRO 425 ME



Advertencia: “Para aplicaciones aéreas y terrestres, se debe respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua”
No contamine las aguas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad y compatibilidad de mezcla antes de su aplicación comercial.

PRESENTACIONES: 200 cc – 1, 4 y 20 Litros

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ.
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2886012**



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Registro Nacional ICA No. 868

Formulado, Distribuido y Comercializado por:

QUIMICOS OMA S.A.

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3

Parque Empresarial AEPI, Bodega 16

PBX: 8985179 – E. Mail: servicioalcliente@quimicosoma.com

Cota (Cundinamarca), Colombia

www.quimicosoma.com